
Colle LIPR-10 A1

1 Question de cours

- i) Donner le théorème des accroissements finis (théorème 6.9).
- ii) Définir "Une fonction f admet un développement limité au voisinage de a ". Quel est son ordre? (définition 7.1).
- iii) Donner la formule de Leibniz pour la dérivée d'un produit (proposition 6.13).

2 Exercice

- a) Etudier en $(0,0)$ les fonctions suivantes. Proposer éventuellement une limite.

$$f(x, y) = \frac{x^3}{y}.$$

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

- b) Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$f = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 + y^2 - 1 & \text{si } x^2 + y^2 > 1 \\ -\frac{1}{2}x^2 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que f est continue.

- c) Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de $f \circ g$ avec $f(x, y, z) = 2xy - 3(x + z)$ et $g(x, y) = (x + y^4, y - 3x^2, 2x^2 - 3y)$. Que vaut la dérivée croisée d'ordre 2 de h ?

Colle LIPR-10 A2

1 Question de cours

- i) (proposition 1.2) Soient D un ouvert de \mathbb{R}^n et $a \in D$. Soient f et g deux fonctions de D dans \mathbb{R} admettant dérivées partielles par rapport à leur variable x_j . Que peut-on dire pour $f + g$, fg et $\frac{g}{f}$? Soyez précis sur les hypothèses et résultats.
- ii) (théorème 5.2) Soient D un ouvert de \mathbb{R}^n , I un intervalle de \mathbb{R} , $t_0 \in I$, f une fonction de D dans \mathbb{R} et γ une fonction de I dans \mathbb{R}^n . Quelles conditions sont nécessaires et suffisantes pour assurer que $f \circ \gamma$ soit dérivable en t_0 . Donner la forme de cette dérivée.

2 Exercice

- a) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. On suppose que $f'(a) > 0$ et $f'(b) < 0$. Montrer que f' s'annule sur $[a, b]$.
- b) Justifier l'existence et calculer les DLs suivants :
 - i) En 0 à l'ordre 3 de $\cos(x)\exp(x)$.
 - ii) En 0 à l'ordre 3 de $\ln(1 + \sin(x))$.
 - iii) En 1 à l'ordre 3 de \sqrt{x} .

Colle LIPR-10 B1

1 Question de cours

- i) Soit f une fonction de D un ouvert de \mathbb{R}^n dans \mathbb{R} . Définir dérivée partielle de f (définition 1.1).
- ii) Définir " f est une fonction polynomiale sur \mathbb{R}^n ".
- iii) (théorème 5.2) Soient D un ouvert de \mathbb{R}^n , I un intervalle de \mathbb{R} , $t_0 \in I$, f une fonction de D dans \mathbb{R} et γ une fonction de I dans \mathbb{R}^n . Quelles conditions sont nécessaires et suffisantes pour assurer que $f \circ \gamma$ soit dérivable en t_0 . Donner la forme de cette dérivée.

2 Exercice

- a) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable admettant des limites finies égales en $+\infty$ et $-\infty$. Montrer que f' s'annule.
- b) Justifier l'existence et calculer les DLs suivants :
 - i) En 0 à l'ordre 4 de $ch(x)\cos(x) + sh(x)\sin(x)$.
 - ii) En 0 à l'ordre 6 de $\ln(\cos(x))$.
 - iii) En 1 à l'ordre 3 de $\exp(\sqrt{x})$.

Colle LIPR-10 B2

1 Question de cours

- i) Définir "La fonction f est dérivable à droite" (définition 6.3).
- ii) Enoncer l'inégalité des accroissements finis (théorème 6.10).
- iii) Donner la formule de Taylor-Young (proposition 7.3).

2 Exercice

- a) Etudier en $(0,0)$ les fonctions suivantes. Proposer éventuellement une limite.

$$f(x, y) = \frac{y^2}{x}.$$

$$f(x, y) = \frac{xy}{x+y}.$$

- b) Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$f = \begin{cases} \frac{xy}{|x|+|y|} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que f est continue. Que peut-on dire des dérivées partielles en $(0,0)$?

- c) Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de $f \circ g$ avec $f(x, y, z) = 2xy - 3(x+z)$ et $g(x, y) = (x + y^4, y - 3x^2, 2x^2 - 3y)$. Que vaut la dérivée croisée d'ordre 2 de h ?

Colle LIPR-10 C1

1 Question de cours

- i) Définir "La fonction f est dérivable à gauche" (définition 6.4).
- ii) Énoncer le théorème de Rolle (théorème 6.8).
- iii) Donner les propriétés d'unicité, de troncature et de parité du développement limité (propriétés 7.1).

2 Exercice

- a) Étudier en $(0,0)$ la fonction suivante. Proposer éventuellement une limite.

$$f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}.$$

- b) Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$f = \begin{cases} x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que f est continue. Montrer que ses dérivées partielles existent et sont continues.

- c) Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de $f \circ g$ avec $f(x, y, z) = 4x^2 + 3(y - z)$ et $g(x, y) = (x^2 + y^2, y - x, x^3 - 3y^2x)$. Que vaut la dérivée croisée d'ordre 2 de h ?

Colle LIPR-10 C2

1 Question de cours

- i) Soit f une fonction de D un ouvert de \mathbb{R}^n dans \mathbb{R} . Définir dérivée partielle de f (définition 1.1).
- ii) Définir ouvert de \mathbb{R}^n étoilé par rapport à un point a (définition 1.6).
- iii) (théorème 5.2) Soient D un ouvert de \mathbb{R}^n , f une fonction de D dans \mathbb{R} , a et $v \in \mathbb{R}^n$. Quelles conditions sont nécessaires et suffisantes pour assurer que f admette en a une dérivée dans la direction v ? Donner la forme de cette dérivée.

2 Exercice

- a) Soit I un intervalle de \mathbb{R} et f une application deux fois dérivable de I dans \mathbb{R} . On considère trois éléments a, b et x_0 de I vérifiant $a \leq x_0 \leq b$. Pour $x \in [a, b]$, on pose $\lambda \in \mathbb{R}$ et

$$g(x) = f(x) - f(a) - (x - a) \frac{f(b) - f(a)}{b - a} - \lambda(x - a)(x - b).$$

Montrer que l'on peut choisir λ tel que $g(a) = g(x_0) = g(b)$. En déduire qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$\frac{f(x_0) - f(a)}{x_0 - a} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} + \frac{x_0 - b}{2} f''(c).$$

- b) Justifier l'existence et calculer les DLs suivants :

- i) En 0 à l'ordre 4 de $ch(x)\cos(x) + sh(x)\sin(x)$.

- ii) En 0 à l'ordre 4 de $\cos(\sin(x))$.

AUTRES EXERCICES

Exercice 1

Soit $f \in C^2(\mathbb{R})$ telle que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad f(x+y)f(x-y) \leq f(x)^2$$

Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x)f''(x) \leq f'(x)^2$$

Exercice 2

Faire l'étude en 0 de la fonction :

$$f : x \rightarrow \ln(1 + \sin(x))$$

Exercice 3

Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de $f \circ g$ avec $f(x, y, z) = 4x^2 + 3(y - z)$ et $g(x, y) = (x^2 + y^2, y - x, x^3 - 3y^2x)$. Que vaut la dérivée croisée d'ordre 2 de h ?

Exercice 4

Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 et 2 de la fonction f suivante :

$$f(x, y) = \frac{x^3 y^3}{x^2 + y^2}.$$

Exercice 5

Déterminer la classe de la fonction suivante sur \mathbb{R}^2 .

$$f = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$