
Colle L2PR-9 A1

1 Question de cours

- i) Définir la convergence de $\int_x^y f(t)$ et son absolue convergence.
- ii) Qu'est ce qu'une intégrale impropre ? Précisez les conditions d'existence (definition 4.2).
- iii) Énoncer le critère de Cauchy pour les intégrales impropres (theoreme 4.1).

2 Exercice

- a) Soit $(x_1 \dots x_n)$ une famille orthogonale. Montrer le théorème de Pythagore en dimension n .
- b) De deux manières différentes, déterminer la matrice du projecteur orthogonal sur P dans la base canonique avec :

$$P = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \oplus \mathbb{R} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Colle L2PR-9 A2

1 Question de cours

- i) Définir un endomorphisme symétrique. Et donner, en le justifiant, un exemple.
- ii) Définir un endomorphisme positif et défini positif. Donner les équivalents matriciels.
- iii) Montrer que si A est une matrice carrée réelle symétrique, il existe D matrice diagonale et P matrice orthogonale, telles que :

$$A = PDP^{-1}$$

(théorème spectral)

2 Exercice

- a) Calculer la série de Fourier trigonométrique de la fonction 2π -périodique $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(x) = \pi - |x|$ sur $] -\pi; \pi[$. La série converge-t-elle vers f ?
- b) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction 2π -périodique, impaire, telle que

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in]0, \pi[\\ 0 & \text{si } x = \pi. \end{cases}$$

- i) Calculer les coefficients de Fourier trigonométrique de f .
- ii) Étudier la convergence de la série de Fourier de f .
- iii) En déduire les valeurs des sommes suivantes :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} ; \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} ; \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} ; \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^2}$$

Colle L2PR-9 B1

1 Question de cours

- i) Définir un espace euclidien et base orthonormée. Quel est le lien entre les deux ?
- ii) Montrer que si un endomorphisme symétrique stabilise un sous-espace, il stabilise son orthogonal.
- iii) Montrer que si A est une matrice carrée réelle symétrique, il existe D matrice diagonale et P matrice orthogonale, telles que :

$$A = PDP^{-1}$$

(théorème spectral)

2 Exercice

Etudier la convergence des intégrales suivantes.

- i) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\exp(x)-1} dx$
- ii) $\int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{\ln(x)}}{(x-1)\sqrt{x}} dx$
- iii) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$
- iv) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x^a} dx$, $a \in \mathbb{R}$.
- v) $\int_0^{+\infty} x^3 \sin(x^8) dx$

Colle L2PR-9 B2

1 Question de cours

- i) Énoncer et démontrer le théorème fondamental de comparaison des intégrales (théorème 4.4)
- ii) Énoncer le lemme d'Abel pour les intégrales (théorème 4.6).
- iii) Donner la définition de série de Fourier réelle de f en précisant les hypothèses sur f (définition 3.7).

2 Exercice

- a) Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien et p un projecteur de E . Montrer que p est un projecteur orthogonal si, et seulement si, $\forall x \in E$:

$$\|p(x)\| \leq \|x\|$$

- b) Montrer l'existence et unicité et calculer a et b tels que

$$\int_0^1 (x^4 - ax - b)^2 dx$$

soit minimum (on pourra traiter cet exercice avec les éléments vus au lycée mais l'approche qui nous intéresse est celle de niveau $L2$.)

Colle L2PR-9 C1

1 Question de cours

- i) Énoncer le théorème de continuité pour une intégrale à paramètre (théorème 5.6).
- ii) Énoncer la règle de dérivation sous le signe d'intégration (aussi notée Formule de Leibniz pour les intégrales ou théorème 5.7).
- iii) Donner la définition de la transformée de Fourier

2 Exercice

- a) On définit une application $\langle \cdot, \cdot \rangle$ de $\mathbb{R}[X] \times \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}$ par la formule, $\forall P, Q \in \mathbb{R}[X]$.

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t)dt$$

- i) Montrer que l'application $\langle \cdot, \cdot \rangle$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.
- ii) Orthonormaliser la base $(1, X, X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$ par le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt.
- iii) Calculer la distance de X^3 à $\mathbb{R}_2[X]$.

Colle L2PR-9 C2

1 Question de cours

- i) Soit E un espace réel. Définir le produit scalaire de $E \times E$ dans \mathbb{R} .
- ii) Montrer que si un endomorphisme symétrique stabilise un sous-espace, il stabilise son orthogonal.
- iii) Soient $(E, \langle | \rangle)$ un espace euclidien et f un endomorphisme de E . Soient $B = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$ une base orthonormée de E et $A = \text{Mat}_B(f)$. Montrer que f est symétrique si, et seulement si, A l'est aussi.

2 Exercice

Etudier la convergence des intégrales suivantes.

i) $\int_0^1 \cos^2\left(\frac{1}{x}\right) dx$

ii) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)}{x^2+1} dx$

iii) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(x) dx}{x^\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$

iv) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx$

v) $\int_0^{+\infty} \cos(\exp(x)) dx$

AUTRES EXERCICES

Exercice 1

Justifier que la matrice A est diagonalisable et trouver la matrice orthogonale P telle que $D = P^tDP$.
On donne :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 2

- i) Soit u un endomorphisme symétrique d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ vérifiant, $\forall x \in E : \langle u(x), x \rangle = 0$. Que peut-on dire de u ?
- ii) Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ symétrique. On suppose qu'il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $A^p = 0$. Que vaut A ?
- iii) Sur $\mathbb{R}[X]$, on suppose le produit scalaire :

$$\langle P|Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t)dt$$

Existe-t-il $A \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\forall P \in \mathbb{R}[X], \langle P, Q \rangle = P(0)$?

Exercice 3

Discuter suivant la valeur de $\alpha \in \mathbb{R}$ la convergence des intégrales suivantes.

i) $\int_0^{+\infty} \frac{x \ln(x) dx}{(1+x^2)^\alpha}$

ii) $\int_0^{+\infty} x^\alpha \ln(x + \exp(\alpha x)) dx$

Exercice 4

Calculer la série de Fourier, sous forme trigonométrique, de la fonction 2π -périodique $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(x) = x^2$ sur $[0; 2\pi[$. La série converge-t-elle vers f ?